

ABSTRAK

KARAKTERISTIK PASIEN HIPERTENSI DI BANGSAL RAWAT INAP SMF PENYAKIT DALAM RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2013

Oleh

Bagus Sedayu

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Sekitar 95% hipertensi adalah hipertensi primer dan 5% adalah hipertensi sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasien hipertensi di bangsal rawat inap SMF penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan observasional. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medik periode 1 Januari sampai 31 Desember 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan *total sampling* dan didapatkan 143 sampel.

Dari hasil penelitian, didapatkan 97,9% adalah pasien hipertensi primer dan sisanya hipertensi sekunder. Persentase kelompok usia ≥ 60 tahun didapatkan paling banyak, yaitu 37,1%. Dari jenis kelamin, wanita lebih banyak dari pria, yaitu 64,3%. 59,4% hipertensi adalah derajat II dan sisanya hipertensi derajat I. Amlodipin merupakan obat antihipertensi yang sering digunakan dengan persentase 31,6%. Gagal jantung merupakan komplikasi yang paling sering didapat dengan persentase 36,1%.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar pasien hipertensi adalah hipertensi primer, kelompok terbanyak usia ≥ 60 tahun, wanita lebih banyak daripada pria, hipertensi derajat II lebih banyak, amlodipin paling banyak digunakan, dan gagal jantung merupakan komplikasi yang paling sering.

Kata kunci: hipertensi, karakteristik hipertensi

ABSTRACT

CHARACTERISTIC OF HYPERTENSIVE PATIENT IN HOSPITALIZATION
WARD FUNCTIONAL MEDICAL STAFF INTERNAL MEDICINE
DEPARTMENT OF RSUP DR. M. DJAMIL PADANG
IN 2013

By

Bagus Sedayu

Hypertension is one of the non-communicable disease that grow health problems in Indonesia. Approximately 95% of hypertension is essential hypertension and 5% is secondary hypertension. The aim of this research is to investigate characteristic of hypertensive patient in hospitalization ward functional medical staff internal medicine department of RSUP Dr. M. Djamil Padang in 2013. The research methods used was descriptive with observational approach. Sample collection was conducted by using secondary data from medical records period January 1st until December 31th, 2013. Sampling was conducted with a total sampling and obtained 143 samples.

From the research, obtained that 97,9% is patient with primary hypertension and the rest is secondary hypertension. The percentage of the age group ≥ 60 years is earned the most, that is 37.1%. By gender, women is more than men that is 64,3%. 59,4% hypertension is stage II and the rest is stage I hypertension. Amlodipine is antihypertensive drugs that often used with a percentage of 31.6%. Heart failure is a complication that is the most often obtained with a percentage of 36.1%.

The conclusion of this research is majority of hypertensive patients is primary hypertension, group age ≥ 60 years is the most, women is more than man, more stage II hypertension, amlodipin is the most used, and heart failure is he most often complication.

Keywords: hypertension, characteristic of hypertension